

RATROM 3G 25 BLOCO

RODENTICIDA – AUTORIZAÇÃO DE VENDA Nº PT/DGS BBP – 158/2019

Propriedades

Isco pronto a utilizar contendo como ingrediente ativo o anticoagulante Brodifacume, efetivo em ratos domésticos (*mus musculus*) e ratos castanhos (*rattus norvegicus*) mesmo após uma única ingestão. A formulação consiste num isco em "bloco parafinado", particularmente atrativa ao paladar de todas as espécies de roenticidas descritas. O produto não causa desconfiança nos outros roedores. Contém um agente amargante destinado a prevenir a ingestão acidental por crianças. Pode ser usado no interior e em redor de edifícios, habitações, armazéns, garagens, arrecadações e jardins envolventes.

Aplicações e Modos de Utilização

Interior de edifícios, para o controlo de rato doméstico (*mus musculus*):

Usar 20-40g de **RATROM 3G 25 BLOCO** por estação de isco, equivalente a 2-4 iscos de roenticida prontos a utilizar de 10g cada. Se forem necessárias várias estações de isco, colocá-las a uma distância de 10-15 metros; a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros. As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e, posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

Interior e em redor de edifícios, para o controlo de rato castanho (*rattus norvegicus*):

Usar 100-200g de **RATROM 3G 25 BLOCO** por estação de isco, equivalente a 10-20 iscos de roenticida prontos a utilizar de 10g cada. Se forem necessárias várias estações de isco, colocá-las a uma distância de 10-15 metros; a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros. Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações. Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade. As estações de isco devem ser visitadas 5 a 7 dias após o início do tratamento e, posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

Composição

100g de produto contém:

- Brodifacume (CAS Nº 56073-10-0): 0.0025g;
- Benzoato de Denatónio: 0.001g;
- Aromas e Co-formulantes: até 100g.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Cor	Azul	-
Odor	A alimentos	-

Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.





Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Ratrom Raticida 3G 25 Bloco **300G** (Cx. 24 uni.) (36092).