

RATROM 3G 25 PELLETS

Isco pronto a utilizar em pellets

PRODUTO BIOCIDA (PT14) – Autorização n. PT/DGS bbb-121/2022

Propriedades

RATROM 3G 25 PELLETS é um isco pronto a utilizar contendo como ingrediente ativo o anticoagulante Brodifacume, efetivo em Ratos Domésticos (*Mus musculus*) e Ratos Castanhos (*Rattus norvegicus*) mesmo após uma única ingestão. A formulação consiste num isco Em “pellet”, particularmente atrativa ao paladar de todas as espécies de roenticidas descritas. O produto não causa desconfiança nos outros roedores.

RATROM 3G 25 PELLETS contém um agente amargante destinado a prevenir a ingestão acidental por crianças.

RATROM 3G 25 PELLETS pode ser usado no interior e em redor de edifícios, habitações, armazéns, garagens, arrecadações e jardins envolventes.

Aplicações e modos de utilização

Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda. Antes do uso de produtos roenticidas devem ser considerados outros métodos de controlo não químicos (por exemplo armadilhas). Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco. As estações de isco devem ser colocadas na proximidade imediata de locais onde foi detetada atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.). Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas. Colocar estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia e de criação e outros animais não visados. Colocar estações de isco longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos. Não colocar as estações de isco junto a sistemas de drenagem de água onde possam entrar em contacto com a água. Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto. No final do tratamento, remover o isco não consumido e as estações de isco. Não abrir as saquetas que contêm o isco. Perigoso para a vida selvagem.

DOSES E MODO DE APLICAÇÃO

Interior de edifícios, para o controlo de Rato Doméstico (*Mus musculus*).

Usar 20-40 g de **RATROM 3G 25 PELLETS** por estação de isco, equivalente a 2-4 iscos de roenticida prontos a utilizar de 10 g cada. Se forem necessárias várias estações de isco, colocá-las a uma distancia de 10-15 metros; a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros. As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

Interior e em redor de edifícios, para o controlo de Rato Castanho (*Rattus norvegicus*).

Usar 100-200 g de **RATROM 3G 25 PELLETS** por estação de isco, equivalente a 10-20 iscos de roenticida prontos a utilizar de 10 g cada. Se forem necessárias várias estações de isco, colocá-las a uma distancia de 10-15 metros; a distância mínima entre as estações



deve ser de 5 metros. Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações. Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade. As estações de isco devem ser visitadas 5 a 7 dias após o início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS

Considerar medidas de controlo preventivas (tapar furos, remoção de potencial comida e bebida tanto quanto possível) para incrementar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinvasão. Não usar rodenticidas anticoagulantes como isco permanente (por exemplo na prevenção da infestação de roedores ou para detetar actividade de roedores) O uso do produto deve eliminar os roedores em 35 dias. No caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (i.e. observação da actividade dos roedores) o utilizador deve procurar aconselhamento do fornecedor do produto ou ligar para um serviço de controle de pragas. Procurar e remover os roedores mortos, pelo menos sempre que se inspecione as estações de isco. Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais. No final do tratamento, eliminar o isco não consumido e a embalagem, em conformidade com os requisitos locais. Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado e ao abrigo da luz solar direta. Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.

INFORMAÇÃO

Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes após o consumo do isco. Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos com as mãos nuas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los. Este produto contém um agente amargo e um corante.

Composição

100 g de produto contém:	
Brodifacume (CAS No. 56073-10-0)	0.0025 g
Benzoato de denatónio	0.001 g
Aromas e co-formulantes	até 100 g

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Aspetto a 20°C	Pellets	---

Conservação e armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / embalagens

- 36002 - RATROM 3G 25 PELLETS 150GR